


Africanized Honey Bees Picture This – Spanish

	QUÉ HACER DESPUÉS DE UNA PICADURA DE ABEJA 3 PASOS RÁPIDOS
Para la mayoría de las personas, la picadura de avispa o de una abeja causa dolor, hinchazón, dolor a la palpación y enrojecimiento cerca de la picadura.	ACUDA A LA SALA DE EMERGENCIAS DE INMEDIATO SI
Trate estos síntomas en casa siguiendo estos 3 pasos: 1  EXTRAIGA EL AGUIJÓN CON UN OBJETO CON BORDES RÁPIDOS. Use un objeto como, como ser una tarjeta de crédito o un cuchillo para mantequilla, para raspar suavemente la zona afectada.  No use pinzas, podrían apretar la bolsa con el veneno del aguijón y empeorar los síntomas.	Experimenta una reacción más intensa. Estos síntomas incluyen: • Sensación de ansiedad, sensación de hormigueo y mareos. • Escarot generalizado y urticaria. • Hinchazón de los labios y la lengua. • Síntomas y dificultad para respirar. • Colapso y pérdida de conciencia.
2  APLIQUE UNA COMPRESA FRÍA Aplique una compresa fría, como una pieza de hielo, una vez que se retire el aguijón para ayudar a aliviar el dolor.  Un antihistamínico tomado por vía oral o aplicado como crema puede ayudar a aliviar la picazón y la hinchazón.	PREVENCIÓN Proteja de las picaduras de avispa y de abeja evitando:  Las abejas y las avispas son criaturas sociales y solo pican a los humanos para proteger sus panales. ¡No las moleste y ellas no le molestarán a usted!
3  ELEVE LA ZONA Eleve la zona, dependiendo de la ubicación de la picadura, para ayudar a reducir la hinchazón.  Estos síntomas pueden durar de unas pocas horas a unos pocos días.	

Fuente: <https://www.msdmanuals.com/>