

Lyme Disease Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. Puedes contraer muchas enfermedades transmitidas por garrapatas a partir de una sola picadura.
2. Cuanto más tiempo esté adherida una garrapata, mayor será el riesgo de enfermedad.
3. La enfermedad de Lyme es un diagnóstico clínico basado en los síntomas, la historia y el examen.
4. Puedes dar negativo en la prueba y aun así tener la enfermedad de Lyme u otras enfermedades transmitidas por garrapatas.
5. Según los criterios de vigilancia de los CDC, una erupción de eritema migratorio (EM) en una zona endémica, significa enfermedad de Lyme.
6. En un área no endémica, la erupción requiere una prueba positiva.
7. No todas las personas que contraen la enfermedad de Lyme presentan un sarpullido.
8. Los síntomas de la enfermedad de Lyme pueden desarrollarse días o meses después de la picadura de la garrapata.
9. Los pacientes de Lyme suelen empeorar antes de mejorar mientras reciben el tratamiento (reacción de Jarisch-Herxheimer).
10. El Lyme puede causar la muerte.

ESTADÍSTICAS

- Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reciben informes de aproximadamente 30.000 casos de la enfermedad de Lyme al año en Estados Unidos.
- Los CDC recomiendan un análisis de sangre de dos niveles para detectar anticuerpos contra la bacteria *B. burgdorferi*.
- Una encuesta realizada en 2014 por LymeDisease.org a más de

3.000 pacientes crónicos de la enfermedad de Lyme, reveló que más del 40% estaba incapacitado para trabajar a causa de la LD.

- Durante el periodo 2008-2015, se notificaron a los CDC un total de 275.589 casos de enfermedad de Lyme (208.834 confirmados y 66.755 probables). La mayoría de los casos se siguen notificando en estados con alta incidencia en las regiones del noreste, el Atlántico medio y el medio oeste superior. Por el contrario, el número de casos ha aumentado en los estados vecinos a los de alta incidencia. Las características demográficas asociadas a los casos confirmados fueron similares a las descritas anteriormente, con un ligero predominio entre los hombres y una distribución de edad bimodal con picos entre los niños pequeños y los adultos mayores.